# **GORDURA DE BOVINOS (SEBO)**



É o produto obtido em graxarias a partir de resíduos de tecido adiposo fundido em recipientes munidos de agitadores e aquecido a fogo direto ou sob pressão de vapor; ou extração por prensas, centrifugas ou pelo método de esgotamento de resíduos ósseos por solventes voláteis.

Designação do Produto:

Óleo de vísceras de aves

Forma física de apresentação:

Óleo/Líguido

Característica da embalagem e forma de acondicionamento:

Acondicionado em tanques

#### Níveis de garantia:

| UMIDADE                               | máx 1,00 % |
|---------------------------------------|------------|
| ÁCIDOS GRAXOS TOTAIS                  | mín 98,00% |
| IMPUREZAS                             | máx 1,00%  |
| ÁCIDEZ LIVRE EM ÁCIDO OLÉICO          | máx 2,00%  |
| ÍNDICE DE PERÓXIDO em meq/1000g       | 5,00       |
| INSAPONIFICÁVEL                       | 0,90 %     |
| ÍNDICE DE SAPONIFICAÇÃO               | 190-202    |
| ÍNDICE DE IODO g I <sup>2</sup> /100g | 35-48      |
| TÍTULO                                | 40-46      |
| PONTO DE FUSÃO                        | 39-42      |



| COMPOSIÇÃO COM OS PRINCIPAIS ÁCIDOS GRAXOS/ CROMATOGRAFIA SATURADOS |        |  |
|---|--------|--|
|   |        |  |
| PALMÍSTICO – C16  | 26,50% |  |
| ESTEÁRICO - C18   | 5,50%  |  |
| INSATURADO  |        |  |
| OLÉICO - C18.1  | 42,90% |  |
| LINOLÉICO - C18.2   | 14,50% |  |
| LINOLÊNICO - C18.3  | 0,80%  |  |

## Indicações de uso e espécie animal a que se destina:

Produto utilizado na composição de rações, dieta animal de monogástricos, cuja sua maioria destina-se á avicultura, suinocultura e uma parte em pet food, fabricação de sabão e fabricação de biodiesel

#### Modo de usar:

O modo de uso dos mesmos, são realizados de acordo com orientação técnica e padrões de cada cliente

## Prazo de validade:

6 (seis) meses

## Condições de conservação:

Acondicionado em tangues

# Restrições e outras recomendações:

O uso deste ingrediente é proibido para ruminantes

